4. Schularbeit

5C

29.5.2008

- 1) a) Berechne für das Dreieck A(7, 1), B(13, 9), C(-2, 14) den Höhenschnittpunkt!
b) Zeige durch Rechnung, dass dieses Dreieck gleichschenkelig ist!
c) Teile die Strecke BC im Verhältnis 3:2 und berechne die Koordinaten des inneren Teilungspunktes!
d) Berechne die Länge der Höhe h_c und damit den Flächeninhalt des Dreiecks mit Hilfe der Vektorrechnung!

- 2) Spiegle im Dreieck A(2, 4) B(-2, 8), C(-4, -4) den Eckpunkt C an der Seite c und berechne die Koordinaten des gespiegelten Punktes!

- 3) a) Bis zu welcher Höhe reicht eine unter einem Winkel von $\alpha=68^\circ$ an eine Hausmauer gelehnte 12m lange Leiter?
b) In welchem Winkel muss man eine um $\frac{1}{2}$ m kürzere Leiter anlehnen, wenn man dieselbe Höhe erreichen will?

- 4) Vom Gipfel des Schwalbenkogels (1420m) sieht man das jenseitige Ufer des Silbersees unter einem Tiefenwinkel von $\alpha=18^\circ$. Ein Boot, das sich in der Mitte des Sees befindet, erscheint unter einem Tiefenwinkel von $\beta=22^\circ$.
 - a) In welcher Seehöhe befindet sich der Silbersee, wenn er 1,2km breit ist?
 - b) Unter welchem Tiefenwinkel erscheint das diesseitige Ufer vom Schwalbenkogel aus?

[1) a) 4P. b) 2P. c) 3P. d) 3P. 2) 3P. 3) a) 2P. b) 3P. 4) a) 3P. b) 3P.]

Lösungen:

1) a) Man berechnet z.B. $AB=(6, 8)$ und $BC=(-15, 5)$ und damit die Gleichungen von h_c und h_a . Man erhält: $h_c: 6x + 8y = 100$ oder $h_c: 3x + 4y = 50$ und $h_a: -15x + 5y = -100$ oder $h_a: 3x - y = 20$. Schneidet man die beiden Höhen, erhält man: $H(\frac{26}{3}, 6)$. Die folgende Skizze zeigt die Lage des Dreiecks mit dem Höhenschnittpunkt.

b) Man berechnet noch $AC=(-9, 13)$, damit ergibt sich für $|AC| = |BC| = 5 \cdot \sqrt{10}$, das Dreieck ist daher gleichschenkelig!

c) Teilt man die Strecke BC innen im Verhältnis 3:2, so gilt für den Teilungspunkt T:

$$T = B + \frac{3}{5} BC = (13, 9) + \frac{3}{5} (-15, 5) = (13, 9) + (-9, 3) = (4, 12).$$

d) Die Gleichung der Höhe h_c lautet $h_c: 3x + 4y = 50$, die Gleichung der Seite c: $-4x + 3y = -25$. Ihr Schnittpunkt liegt bei $F(10, 5)$. Damit gilt für die Länge von h_c : $|FC| = |(-12, 9)| = 15$. Wegen $|AB| = 10$ gilt für den Flächeninhalt $A = \frac{1}{2} \cdot 150 = 75$ Flächeneinheiten!

2) Im Dreieck $A(2, 4)$ $B(-2, 8)$, $C(-4, -4)$ gilt: $AB=(-4, 4)$. Damit gilt für die Seite c: $x + y = 6$. Die Gleichung einer Normalen auf c durch C (das ist h_c !) lautet daher: $-x + y = 0$.

Schneidet man diese beiden Geraden, erhält man $F(3, 3)$. Für den gespiegelten Punkt C_1 gilt daher: $C_1 = F + CF = (3, 3) + (7, 7) = (10, 10)$. Die folgende Skizze zeigt die Lage des gespiegelten Punktes!

3) a) Es gilt: $\sin(68^\circ) = \frac{h}{12}$ und daher: $h = 12 \sin(68^\circ) = 11,126$ m.

b) Es gilt jetzt $\sin(\alpha) = 11,126 / 11,5$ und daraus berechnet man $\alpha = 75,3517^\circ$.

4) Aus der nebenstehenden Skizze erkennt man, dass man die Länge x mit Hilfe des Sinussatzes folgend berechnen kann. Es gilt:

$$\frac{600}{\sin(4^\circ)} = \frac{x}{\sin \alpha}. \text{ Daraus folgt } x = 2657,96 \text{ m. Damit kann man h aus der}$$

Beziehung: $\sin \beta = \frac{h}{x}$ berechnen. Man erhält $h = 995,69$ m. Daher liegt der Silbersee in einer Seehöhe von 424,31 m. Um den Tiefenwinkel zum diesseitigen Ufer zu bestimmen, berechnet man zunächst die waagrechte

Entfernung des Bootes vom Berg. Für diese Länge y gilt: $\tan \beta = \frac{h}{y}$. Man

erhält: $y = 2464,42$ m. Für den gesuchten Tiefenwinkel γ gilt dann:

$$\tan \gamma = \frac{h}{y - 600}. \text{ Man erhält: } \gamma = 28,104^\circ.$$